

Linee guida nel trattamento post-chirurgico di ricostruzione del L.C.A.

Pagina 1 di 2


Dal 2° al 30° giorno dall'intervento (1° mese)

- Deambulazione con due bastoni canadesi per 21gg; carico a tolleranza
- Mobilizzazione attiva, passiva, assistita, fino a raggiungere:
 - estensione completa
 - flessione a 90° nei primi 15 giorni, 120° nei giorni successivi
- Contrazioni statiche e isometriche (vedi disegni sotto)
- Ginnastica assistita in acqua




Estendere al massimo la gamba, mediante un'intensa contrazione del quadricipite, flettere dorsalmente il piede; mantenere per dieci secondi, poi rilassarsi.

Ripetere 20 volte



Una gamba è piegata e ferma, l'altra è estesa al massimo (il quadricipite è contratto) col piede in flessione dorsale. Portare, in dieci secondi, la coscia della gamba tesa al livello dell'altra piegata, quindi ridiscendere in altri dieci secondi.

Ripetere 20 volte



ripetere l'esercizio 2 con il piede extraruotato (punta del piede verso l'esterno)

Ripetere 20 volte

Linee guida nel trattamento post-chirurgico di ricostruzione del L.C.A.

Dal 31° al 90° giorno (2°-3° mese)

- Mobilizzazione passiva, passiva ed assistita mirata a:
 - mantenere la mobilità in estensione
 - raggiungere la massima flessione
- Ginnastica propriocettiva
- Contrazioni statiche ed isometriche e progressivamente in carico fino ad eseguire semipiegamenti mini squatt
- Elettrostimolazioni (in catena chiusa) a frequenze basse o medio basse
- Ginnastica in acqua
- Dal 3° mese nuoto solo pinneggiante (evitare la rana)

Dal 91° al 150° giorno (4°-5° mese)

- Ginnastica propriocettiva avanzata (con particolare riferimento agli esercizi sul piano sagittale ed in forma sempre più dinamica)
- Trofismo isotonic in catena cinetica chiusa (leg press) e progressivo trofismo dei flessori in catena aperta
- Elettrostimolazioni (in catena chiusa) a frequenze medie
- Nuoto degli stili tradizionali (esclusa rana)

Dal 151° al 180° giorno (6° mese)

- Ginnastica propriocettiva sempre più dinamica (saltelli, skip, andature di vario tipo, tappete-elastico)
- Trofismo muscolare in catena cinetica chiusa (leg press, piegamenti) ed in catena cineticaa-aperta (leg curl) iniziando progressivamente il movimento di estensione contro-resistenza (leg-extension)
- Elettrostimolazioni a frequenze medie e medio-alte
- Andature che portino progressivamente alla corsa

Dal 181° giorno (7° mese)

- Test isocinetico
- Trofismo isocinetico, isotonic completo con elettrostimolazioni a frequenze medie e medio alte
- Corsa
- Progressivo ritorno alla pratica sportiva

Controlli clinici

A 7, 15, 30, 90, 180 giorni dall' intervento